

GUIDE VOLAILLES

PRÉPARER LA RÉCEPTION DES OISEAUX

- Préchauffer la pièce à 20 degrés pendant 48 h pour éliminer l'humidité.
- Appliquer 7 à 10 cm (3 à 4") de litière
- Installer une lampe chauffante à 16" du sol (50 à 100 poussins/lampe).
En période froide, ajouter une source additionnelle de chaleur.
- Remplir les trémies : 5 à 10 kg/50 poussins.
- Remplir les abreuvoirs : 4 à 5 litres/50 poussins

Les oiseaux ne devront jamais être privés d'eau, de moulée et de litière sèche.



GUIDE DE RÉGIE ALIMENTAIRE - POULET DE GRAINS

Code de produit	Âge (semaines)	Quantité (kg/oiseau)
702 - Début poulet	0-4 semaines	2,2 kg
703 - Croissance poulet	5-7 semaines	4,5 kg
704 - Finition poulet	8 semaines et plus	250 gramme/jour



GUIDE DE RÉGIE ALIMENTAIRE - DINDE DOMESTIQUE

Code de produit	Âge (semaines)	Quantité (kg/oiseau)
844 - Début dinde	0-4 semaines	2,7 kg
843 - Croissance/ finition dinde	5-10 semaines	7 kg
843 - Croissance/ finition dinde	10-15 semaines	13,3 kg
843 - Croissance/ finition dinde	15-20 semaines	17,5 kg

L'écaille d'huître est à prévoir après l'âge de 4 semaines pour améliorer l'efficacité du gésier et réduire la mortalité.

Pour ceux qui utilisent les grains mélangés, il est important de ne pas l'introduire trop hâtivement en fin de croissance (moins de 25% de la ration totale), car les oiseaux manqueront de protéines, de minéraux et vitamines. Ils auront tendance à faire moins de viande et plus de gras.

Le comportement des oiseaux selon la température est à observer. Des oiseaux qui ont froid seront moins actifs et auront tendance à s'entasser les uns sur les autres. Ils boiront et mangeront moins. Leur croissance sera donc ralentie.

À noter : Si les oiseaux s'entassent sous la lampe : ils ont froid.
S'ils se réfugient le long de la clôture, les becs ouverts : ils ont trop chaud.

TEMPÉRATURE - POULETS DE GRAIN		
Âge semaines	Température ¹ sous les éleveuses	Éclairage ² heures
1	32 à 33 °C (90 à 95 °F)	22 à 24
2	29 à 30 °C (84 à 86 °F)	16 à 18
3	26 à 27 °C (80 à 82 °F)	16 à 18
4	21 °C (70 °F)	16 à 18
5 à 8	21 °C (70 °F)	12 à 16
9 à 12	18 à 20 °C (65 à 69 °F)	12 à 14


TEMPÉRATURE - DINDE DOMESTIQUE		
Âge semaines	Température ¹ sous les éleveuses	Éclairage ² heures
1	35 °C (95 °F)	22 à 24
2	32 °C (90 °F)	16 à 18
3	29 °C (85 °F)	16 à 18
4	27 °C (80 °F)	16 à 18
5	24 °C (75 °F)	12 à 16
6 et plus	18 à 21 °C (64 à 70 °F)	15

¹ Se méfier des baisses de température nocturnes. Il est recommandé d'avoir une source de chaleur efficace et un thermomètre de bonne qualité. S'il est impossible de maintenir une température constante la nuit, il est fortement conseillé de démarrer un lot durant la période estivale.

² Il est à prévoir de réduire l'intensité lumineuse (réduire la puissance de l'éclairage) si les oiseaux sont nerveux ou agressifs.

GESTION DES TRÉMIES

La première journée, les trémies et les abreuvoirs doivent être au sol, facile d'accès et placés à la périphérie de la zone de chaleur.



Après quelques jours, les trémies et les abreuvoirs doivent être au niveau du dos des oiseaux pour éviter le gaspillage.

On anticipe une consommation d'eau d'environ 2 ml d'eau/g de moulée ingérée.

GUIDE DE CONFORT

Trop élevée




Oiseaux s'éloignent les uns des autres

Adéquate



Oiseaux forment des groupes de 20 à 30 avec mouvements entre les groupes

Trop basse



Oiseaux forment des groupes d'individus nombreux et serrés

PRÉPARATION À L'ABATTAGE

Important : Pour les éleveurs qui font abattre par un abattoir, il est préférable de réserver une date d'abattage dès la réception des poussins.