

Ponte Caille 16% #824

Moulée complète pour les gibiers à plumes en ponte



La *Moulée Petits Gibiers Ponte 16%* est destinée aux propriétaires de petits gibiers à plume en période de reproduction ou pour la production d'œufs à petite échelle. Cet aliment est formulé pour rencontrer les besoins nutritionnels des oiseaux en période de ponte et/ou reproduction.

Caractéristiques	Avantages
<i>Aliment complet</i>	Doit être utilisé comme seul aliment
	Aliment équilibré
<i>Source de protéine végétale équilibrée</i>	Ne contient pas de farines d'origine animale
<i>Contient des acides aminés de synthèse</i>	Rencontre mieux les besoins en acides aminés des oiseaux en ponte, favorise la production d'œuf, la fertilité et l'éclosion des poussins, la croissance et le renouvellement des plumes, tout en réduisant les rejets d'azote dans l'environnement (ammoniac entre autres)
<i>Gras</i>	Ne contient pas de graisses ajoutées d'origine animale
<i>Énergie</i>	Niveau modéré d'énergie pour éviter l'engraissement inutile des oiseaux – en période froide, il peut être approprié d'avoir un aliment plus riche en énergie.
<i>Minéraux & Vitamines</i>	Procure les nutriments nécessaires pour la production d'œuf, la fertilité et l'éclosion, pour la solidité des aplombs et le maintien du système immunitaire, essentiel à une bonne santé
<i>Vitamine E de source végétale (d-α-tocophérol)</i>	Protège les tissus contre les dommages causés par l'oxydation, stimule les fonctions immunitaires, réduit la mortalité en présence de maladies, réduit les effets négatifs du stress et des infections
	La vitamine E de source végétale est plus bio-disponible que la forme synthétique
	Aide à maintenir une production d'œuf soutenue et à préserver la qualité intrinsèque de l'œuf (ex : acides gras)
<i>Contient de la Phytase et autres enzymes</i>	Réduit les rejets de phosphore dans l'environnement tout en améliorant l'utilisation digestive des nutriments
<i>Probiotiques</i>	Favorisent une meilleure santé du système digestif

Texture / Emballage :

- Granule Moyen/ sacs de 40 kg



Ponte Caille 16% #824

Moulée complète pour les gibiers à plumes en ponte



ANALYSE TYPIQUE		
Contient 0,3 ppm de sélénium ajouté		
Protéine brute	Min	15,7 %
Matière grasse	Min	3,0 %
Fibre brute	Max	4,5 %
Sodium	Réel	0,16 %
Calcium	Réel	3,40 %
Phosphore	Réel	0,55 %
Vitamine A	Min	10 500 UI/kg
Vitamine D	Min	3 000 UI/kg
Vitamine E	Min	24 UI/kg

MODE D'EMPLOI : Servir la *Moulée Petits Gibiers Ponte 15%* comme seul aliment aux oiseaux en période de ponte en libre choix. Commencer à distribuer l'aliment ponte environ 1 mois avant le début de la période de ponte. De l'eau propre et fraîche devrait être disponible en tout temps.

On peut distribuer de la pierre à chaux grossière et du gravier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre représentant technique.

MISE EN GARDE : Suivre soigneusement le mode d'emploi.

S'assurer que l'aliment soit frais (distribution journalière) et se débarrasser de l'aliment défraîchi régulièrement. Ajuster les mangeoires et les quantités de moulée pour minimiser le gaspillage autour des mangeoires. On peut laisser les oiseaux vider les mangeoires complètement une fois par jour afin de stimuler la consommation et réduire le gaspillage. Ne pas laisser les mangeoires vides trop longtemps.

Consommation d'aliment et d'eau selon l'espèce

Espèces	Caille	Perdrix	Faisan	Pintade	Canard	Oie	Dinde
Consommation (g/j)	20-35	30-40	55-60	80-125	150-215	200-325	225-365
Eau (ml/j)	40-70	60-80	110-120	160-250	300-430	400-650	450-730

Espace – exemples

Espèces	Espace (pi ² /oiseau)			Espaces de mangeoire (pouces/oiseau)	Espace d'abreuvement (pouces/oiseau)*
	Cage	Plancher	Parcours		
Dinde sauvage/Oie	2,5-3	10-12	25-35	6	2
Faisan	1-1,5	6-8	25-30	4	1
Perdrix	0,5-1,0	3-4	4-6	2	1
Caille	0,5-0,7	2-3	3-4	1	½

Note : l'observation des oiseaux et des conditions d'élevage sont essentielles pour optimiser le bien-être des oiseaux – dans le cas où des tétines sont utilisées, 1 tétine/10 individus devrait être suffisant.